

## 组织固定液(10% FA,RNase free)

### 产品简介:

固定的目的在于保存细胞和组织的原有形态结构, 固定剂能阻止内源性溶酶体酶对自身组织和细胞的自溶、抑制细菌和霉菌的生长, 固定剂通过凝固、生成添加化合物等使蛋白质内部结构发生改变, 从而使酶失活。固定剂对细胞核细胞外成分发生物理改变。固定液主要分为醛类固定液、汞类固定液、醇类固定液、氧化剂类固定液、苦味酸盐类固定液等, 较为常用的是醛类中的福尔马林、醇类中的乙醇。

Leagene 组织固定液(10% FA,RNase free) 又称作福尔马林固定液(10%,RNase free), 主要由甲醛、去离子水组成, 经 RNase free 处理, 该固定液适合于绝大多数组织的固定, 尤其适用于与 RNA 有关的实验样本的固定。该试剂仅用于科研领域, 不适用于临床诊断或其他用途。

### 产品组成:

名称	编号	DF0109	Storage
	组织固定液(10% FA,RNase free)		500ml
使用说明书			1 份

### 操作步骤(仅供参考):

- 1、按实验具体要求操作。
- 2、一般标本固定时间控制在 1~4h/mm, 大标本应适当延长固定时间。
- 3、固定好的组织, 可在组织固定液(10% FA,RNase free)或 70%乙醇中长期保存。

### 注意事项:

- 1、组织固定液(10% FA,RNase free)有一定刺激性和腐蚀性, 请在通风较好的环境下操作, 避免吸入。
- 2、组织取材的厚度不同, 固定时间也不同; 常规活检组织比较适合的厚度为 2~4mm, 一般不超过 6mm; 对组织恰当的选材有利于固定液的渗透。
- 3、固定液的容量应足够, 一般固定液与组织块的体积比率应大于 10:1; 如果容积不够大, 可以在固定期间更换 1~3 次固定液。
- 4、温度对固定的影响很明显, 提高温度可以加速固定作用, 但温度不宜过高。
- 5、取出新鲜组织后应及时固定, 无法及时固定时, 应保存于生理盐水中及时送检。
- 6、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。
- 7、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

**有效期：** 12 个月有效。常温运输和保存。

**相关产品：**

产品编号	产品名称
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
DF0135	组织细胞固定液(4% PFA)
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)
PS0013	RIPA 裂解液(强)
PW0082	丽春红 S 染色液(1×Ponceau S)
TC0713	葡萄糖检测试剂盒(GOD-POD 比色法)