

植物叶片蛋白提取试剂盒

产品简介:

蛋白质是构成植物细胞的基本组成物质之一,在植物细胞生长发育的过程中起着重要的作用,植物的根茎叶都有大量蛋白质的合成,尤其在新生的组织和细胞中蛋白质尤其丰富,植物体内的蛋白质是在细胞内的核糖体上合成,合成的蛋白质可以作为细胞结构的组成物质,还可以参与细胞中的酶促反应。而在茎叶细胞中不断供构建新的细胞组织和器官的蛋白质,被称之为植物叶蛋白(Leaves Protein Concentrates 简称 LPC),它们属于功能性蛋白质类。由于是存在植物茎、叶中,所以是一种最大的可再生的蛋白质资源。植物叶蛋白含有 17~18 种氨基酸,包含了人体所必需的 8 种氨基酸,还含有维生素,与动物肌肉蛋白不同的是植物叶蛋白不含饱和脂肪酸和胆固醇。随着食品工业的发展和人民生活水平的提高,绿色食品越来越受到人们的喜爱,从植物中提取叶蛋白,具有可观的应用前景。

Leagene 植物叶片蛋白提取试剂盒可从植物样本中提取植物叶片蛋白,操作简单快捷,含有蛋白酶抑制剂,可以有效抑制蛋白的降解,并维持原有的蛋白间相互作用,该试剂盒主要用于从植物样本中提取植物叶片蛋白,提取的蛋白可用于 Western Blot、免疫组化、酶活性测定等下游实验。该试剂盒仅用于科研领域,不适用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	PS0210	Storage
植物叶片蛋白提取试剂		20T	4°C
使用说明书		20ml	1 份

自备材料:

- 1、液氮、植物叶片、研钵或匀浆器、离心管、离心机

操作步骤(仅供参考):

- 1、称取 100mg 植物组织,液氮研磨成粉,放入 1.5ml EP 管。
- 2、加入 1ml 蛋白提取试剂。100°C, 10min 金属浴。(必需用金属浴,EP 管上压放表面水平的重铁块,如果用沸水浴,EP 管受热曝开,叶片蛋白提取液飞溅丢失,实验失败。)
- 3、关闭电源,冷却到常温,再拿出 EP 管。
- 4、13000rpm,离心 1min。
- 5、取上清 1ul 测定蛋白浓度;取上清 10ul 或者 20ul,上样做 SDS-PAGE 电泳,胶做考马斯亮蓝或者银染,或者胶转膜做 western-blot。

注意事项:

- 1、使用液氮时, 请注意戴上防冻手套, 避免液氮冻伤。若研磨的组织量较多, 可多次加入液氮, 保持植物组织处于充分冷冻状态时研磨。
- 2、植物细胞壁的破碎程度会影响蛋白的抽提效果, 故尽量将植物组织充分研磨粉碎, 以破碎细胞壁, 促进细胞中蛋白的释放, 同时尽量不要取植物的微管组织。
- 3、使用后请立即旋紧瓶盖, 防止溶液挥发和与空气中的物质发生化学反应。
- 4、试剂开封后请尽快使用, 以防影响后续实验效果。

有效期: 12个月有效。常温运输, 4℃保存。

相关产品:

产品编号	产品名称
CC0022	D-Hanks 平衡盐溶液(1×,含酚红)
CC0130	胰蛋白酶-EDTA 溶液(0.25%:0.02%)
CS0001	ACK 红细胞裂解液(ACK Lysis Buffer)
DC0032	Masson 三色染色液
NR0003	Lezol(总 RNA 提取试剂)
TC0699	植物总糖和还原糖检测试剂盒(DNS 比色法)
TO1013	丙二醛(MDA)检测试剂盒(TBA 比色法)