

乳酸脱氢酶染色液(H型,四唑盐法)

产品简介：

乳酸脱氢酶(Lactate dehydrogenase, LDH)能把乳酸氧化为丙酮酸，该酶存在于能进行糖酵解的细胞中，在细胞受伤死亡时酶被释放出来，LDH有五种同工酶，LDH_{1~5}分别存在于不同组织中，含此酶活性高的组织为肝脏、骨骼肌，其正常红细胞的LDH活性比血清高约100倍；LDH₁为H型(心型)，与氧代谢有关；LDH₅为M型(肌型)，与厌氧代谢有关。

Leagene 乳酸脱氢酶染色液(H型,四唑盐法)以乳酸为底物，在酶作用下脱氢，硝基蓝四唑(nitro BT)为受氢体，接受氢后被还原为甲噁，呈蓝紫色，用以代表H型乳酸脱氢酶(心型，即LDH₁)的活性，LDH₁孵育液中含有特殊的中间递氢体，使定位更准确，染色更清晰。该试剂仅用于科研领域，不宜用于临床诊断或其他用途。

产品组成：

名称	编号	Storage
试剂(A): LDH ₁ 孵育液	DE0071 60ml	4°C 避光
试剂(B): LDH ₁ 对照液	50ml	4°C 避光
使用说明书	10ml	1份

自备材料：

- 蒸馏水、甘油明胶
- 恒温箱或水浴锅

操作步骤(仅供参考)：

- 冰冻切片，厚6μm，无需固定。
- 切片入LDH₁孵育液中置于37°C温箱，浸染。
- 蒸馏水冲洗。
- 甘油明胶封固，镜检。

染色结果：

LDH ₁ 酶活性部位	蓝紫色沉淀
线粒体	蓝紫色颗粒

阴性对照(可选)：

相同切片入 LDH₁对照液中，置于 37°C温箱，浸染约 5 ~ 30min，作为对照；其余步骤同正常步骤，结果为阴性。

注意事项：

- 1、该染色液适用于冰冻切片。
- 2、对冰冻切片染色时，应减少切片在室温暴露的时间。
- 3、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期： 6 个月有效。低温运输，4°C保存。