

植物胼胝质染色液(苯胺蓝可见光染色法)

产品简介:

胼胝质(callose)是一种由葡萄糖残基按不同于纤维素的方式连接起来的非纤维素多糖,在植物的筛管代谢、配子体发育等生命活动中发挥着重要的调节作用,其合成、分解直接关系到植物正常的生长代谢过程,因此,胼胝质的代谢是植物研究中的重要内容。

Leagene 植物胼胝质染色液(苯胺蓝可见光染色法)利用苯胺蓝可特异性将植物胼胝质染为蓝色,在可见光显微镜下可直接观察。该产品仅用于科研领域,不用于临床诊断或其他用途。

产品组成:

名称	编号	DP0520	Storage
植物胼胝质染色液		50 ml	RT
使用说明书		一份	

自备材料:

1、新鲜的植物组织、AAF 固定液或 Carnoy 固定液、50%乙醇、无水乙醇、1×PBS

操作步骤(仅供参考):

- 1、新鲜植物组织切成 2mm 左右的薄片,植物叶片推荐裁剪成 1cm*2cm,幼嫩植物叶片可直接浸于 AAF 固定液或 Carnoy 固定液固定 24 小时。
- 2、使用无水乙醇浸洗两次,每次 1 分钟,然后转入至少 10 倍体积的 100%乙醇中保存。
- 3、染色前取出组织,浸于 50%乙醇中平衡 30min,取出稍沥干。
- 4、随后浸于 1×PBS 中平衡 30min,取出稍沥干。
- 5、组织切片滴加或浸于胼胝质染色液中,室温避光染色 4~24 小时。
- 6、用蒸馏水冲洗组织切片,小心的将染色后的组织转移至载玻片上,滴加少量甘油明胶封片剂后封片观察。

染色结果:

胼胝质呈蓝色。

注意事项:

- 1、在条件允许下,推荐将浸于固定液中的植物组织负压真空处理 20min,有助于固定液的渗透。

- 2、如暂时不进行实验或需同时处理大量样本，浸于 100%乙醇的样本可于 2-8℃保存至少 1 周。
- 3、样本染色完成后尽快拍照保存结果。
- 4、试剂开封后请尽快使用，以防影响后续实验效果。
- 5、为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月。室温运输和保存。

相关产品：

产品编号	产品名称
DG0005	糖原 PAS 染色液
DP0013	GUS 染色液(即用型)
DP0030	DAB 染色液(1mg/mL,pH3.8)
DP0406	植物纤维素染色液(氯碘化锌法)
DP1140	绿色标本保色液(快速)
NE0011	CTAB 抽提液
NH0043	SSC 缓冲液(20×,pH7.0)
NH0053	变性鲑鱼精 DNA(10mg/ml)
NR0001	DEPC 处理水(0.1%)
NR0040	RNase A(10mg/ml)
PW0040	Western blot 一抗稀释液
TC1213	总胆固醇(TC)检测试剂盒(COD-PAP 单试剂比色法)